

局麻中毒疑い

【症状】

耳鳴り・味覚異常
発汗・多弁
けいれん
意識消失
呼吸抑制
低血圧
心停止

* 初期症状は 30 分以内に現れる

受け持ち助産師

ナースコールにて人員確保

・フェンタカクテル中止
・補液全開(ボルベン・ソリューゲン F)

・物品を集める
・救急カート
・不整脈の確認
・不整脈あり→母体心電図の印刷開始
・経時記録

・20%イントラリポス 250ml 全開投与
・100ml を 1 分で投与(バックを搾る)
・残りの 150ml+250ml を 20 分で投与
(1 秒間に 6 滴)

症状の確認・対応

けいれん	呼吸停止	徐脈	低血圧	心肺停止
・ジアゼパム(セルシン) 原液1ml(5mg) 静注無効なら2分あけて 1ml静注(2mlまで) ・呼吸抑制注意	・マスク(酸素10l換気) ・吸引準備 ・気管挿管準備 ・Tube6.5mm ・マックグラス	・エフェドリン1ml (40mg/1ml)+生食9ml (10倍希釈)1~2mlずつ 静注 ・アトロピン原液1ml	・Wルート確保 ・ボルベン全開 ・下肢挙上 ・子宮左方移動 ・エフェドリン 1ml(40mg/1ml)+ 生食9ml(10倍希釈) 1~2mlずつ静注	・心肺蘇生 ・死戦期帝王切開

* 赤字は即座に実施

帝王切開の判断・または母体搬送