

# 心肺停止 (CPA) などの緊急事態発生時

注 : CPA = Cardiopulmonary Arrest

## 心肺停止 (CPA) 発生 (気道閉塞、高度徐脈など CPA に準ずる患者も含む)

時間は？

平日日中

平日 8～20時  
第2, 4 土曜日(開院日) 8～13時

夜間休日

平日 20時～翌8時  
第1, 3, 5 土曜日、休日、祝日

ドクターハートの院内一斉放送を依頼 (依頼職種は問わない)  
電話交換室 内線「9」へ電話をかける  
「ドクターハートをお願いします。〇〇(場所、部署)です」

- ① 責任当直 へ連絡  
(救急対応時は、他の当直)
- ② 管理師長 へ連絡

電話交換手が院内一斉放送をする  
「ドクターハート、ドクターハート、  
〇〇(場所、部署)へお願いします」

※一斉放送の入らない ICU(1351) と麻酔科控え室(1330) に電話をかけ、上記を伝える。  
ICU は看護師が応答するまで、麻酔科控え室は5コールまでとする。

放送を聞いた医師  
(責任当直)は、業務に支障がない限り、放送(連絡)された現場に駆けつけ CPA 患者の対応を行う

# 院内急変への迅速対応チーム（RRT）相談フロー

RRT ラウンド 毎週火曜日 14 時～

RRT 起動基準\*に該当

RRT コール PHS 7795

(平日日中のみ対応)

患者名、病棟、コールした理由、患者の状態等を簡単に教えてください

RRT 看護師がコール対応

連絡

RRT 医師

RRT 医師・看護師が病棟へうかがいます  
病棟の医師・看護師と患者対応を行います

*"Thank you for calling"*

予期できる急変を防ぎましょう

\* RRT 起動基準 (小児患者については別基準参照)

項目	内容
呼吸	新たな自発呼吸回数の変化 8 回 / 分以下 または 30 回 / 分以上
	新たな SpO2 の低下 90 % 未満
循環	新たな収縮期血圧の低下 90 mmHg 未満
	新たな心拍数の変化 40 回未満 または 130 回以上
尿路	新たな尿量の低下 50 ml / 4 時間以下
神経	新たな意識レベルの変化 GCS 2 点以上の低下 / 新たに出現した興奮・せん妄
全般	患者に対する懸念「何か変」「何かいつもと違う」
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 担当医師と連絡がとれない / 担当医師が対応困難</li><li>・ 治療で患者の状態が好転せず相談したい</li><li>・ 出血傾向 (血小板 : 2000/μg 以下)</li><li>・ 凝固異常 (INR3 以上)</li></ul>